


Fra æg til kylling

Et æg indeholder alt hvad der skal til for at producere en kylling undtagen ilt. Skallen er lavet så smart at den er gennemhullet som en si, og igennem disse huller kan ilten trænge igennem skallen udefra og kultveiltten gennem indefra. Lige under skallen bliver ilten opfanget af en hinde, der er forsynet med meget små blodkar, som igen forsyner navlestrengen med blod. I den runde ende af ægget er der under skallen en luftblære. Det er størrelsen på denne som viser om rugningen forløber som den skal.



Allerede efter et ½ døgn rugning kan man se kimpletten, der udvikler sig til en kylling.




Efter 3 døgn er der dannet et meget fint spind af blodårer på hele blommens overflade. Det er gennem disse blodårer næringen transporteres til det lille kyllingefoster inde i æggeblommen.



1 uge senere altså efter 10 dages rugning er kropsdelene dannet. Undtaget vingerne, de bliver først færdigdannet efter klækningen.



En uge til klækningen. Kyllingen fylder nu næsten hele ægget. Der er dannet dun og der er ikke meget næring tilbage i blommen.



På 21 døgn starter klækningen, alt efter hvor omhyggelig man har været med temperaturen i rugemaskinen.



Det kan tage op til 24 timer, fra der går hul på ægget og til kyllingen kommer ud.



Pyha endelig ude. Så kan man godt være lidt udmattet.



Og her er vi så-dejlige dunede kyllinger.

